

纯净天然无污染的一流生态环境,成就了



中有绿生大米

中有绿生大米颗粒饱满、晶莹剔透;做成米饭 后油光发亮、松散清爽,入口绵润筋道、爽口馨香;所熬之粥浮油如乳,汤如琼浆。

新疆伊犁大米即将进京 预订电话 010—62081663

中有绿生(北京)农业科贸有限公司大米生产基地位于新疆维吾尔自治区西部伊犁河谷盆地伊犁河南岸和中天山西端的纯农牧县察布查尔县绰霍尔乡不占村。伊犁河源自俄罗斯,流经新疆察布查尔地区,又流回俄罗斯,形成一个环路。伊犁河流域是世界无人区,也是世界生态环境保护得最好、最洁净的地区。辖区气候温和,无霜期103天—191天,年日照在2699小时—3158小时。水稻灌溉采用的水源是来自富含丰富矿物质的天山乌孙山脉冰川雪水,由伊宁河流动活水自流灌溉。由于千年冰川冻土地砂壤通透性好,不施加任何化肥农药,没有污染,水稻无病虫害,富含矿物质和微量元素。矿泉水孕育出的中有绿生大米天然生长、冷水灌溉,生长周期慢。因此,亩产极低,营养指标远高于其他普通大米,是米中难得的珍稀极品。

中有绿生大米生长期长、干物质含量高,矿物质、微量元素、维生素、蛋白质等成分明显高于一般大米,兼具和田羊脂玉般的质感和泰国香米的浓郁芳香以及日本大米的口感,用其蒸制的米饭,口感醇厚清香,洁白如脂,粘而不腻,油润回味;食之甜、软、劲、爽,堪称为极品,是款待贵客的珍膳。

中有绿生大米采取有机种植标准,从育苗插秧到收割都在农业专家的指导下严格按照有机水稻种植标准进行操作及田间管理,

拒绝一切农药、化肥;施用有机肥,采取生物除虫、人工除草,以确保大米的顶级品质。

自然条件优越

光照好 伊犁辖区气候温和,适宜水稻种植。

水源好 中国作家协会副主席蒋子龙曾在他的文章中写道:只要天上还落雪,就骗不了珠穆朗玛和海拔7447米的天山。只要地球上还有季节变化,天山之水就会源源不断地流下来。的确,伊犁河是雪水融汇而成的雪水河。而中有绿生大米就是用伊犁河水引灌而生的。科学家研究认为,用雪水浸种能促使农作物的根系发达不生虫。稻种经过雪水浸后,空壳率低,增产达19.3%。雪水中“重水”含量比普通水少1/4。同时雪水中含有较多的氮化物,比雨水高5倍,比普通水更高,可以说是一种肥水。

天然冰雪灌溉完全零污染

土质及肥源好 由于伊犁地表矿物质含量高,雨水和雪水经地表流动汇聚成自然的矿泉水,为水稻生长提供了充足的钙、磷、铁、锌、硒、镁、硅、钾、锗、铜、锰、矽、氮等。同时,察布查尔湿地有机腐质厚度达2米以上,所含有机物高达15%以上,为此也决定了中有绿生大米的糖含量、晶体密度、透明



度和水稻淀粉的含量,米中抗衰老(脑黄金)元素含量得到提高。

质量监管好 中有绿生大米在生产、加工和销售环节方面建立了严格的监管体系,保证水稻按照标准收割。

大米质量好 中有绿生大米颗粒饱满、晶莹剔透,做熟的米饭油光发亮、松散清爽,入口绵润筋道、爽口馨香;所熬之粥浮油如乳、汤如琼浆。

中有绿生(北京)农业科贸有限公司的基地选用农林315优良稻种,由具有多年水稻种植经验的新疆伊美乡米业有限责任公司负责种植,基地533亩水稻田拒绝一切农药、化肥,施用有机肥,采取生物除虫、人工除草。另有1000多亩无公害种植的水稻。

中有绿生(北京)农业科贸有限公司对中有绿生大米进行终端检测,把一切不安全因素拒之门外,并在严格把好每一个生产环节的同时,对到京的每一批产品将邀请工商部门或权威部门进行销售前抽检,给消费者一个安全、营养的承诺。

目的

本规程规定了有机水稻栽培技术、管理和稻谷储藏等。

范围

本程序适用于有机水稻种植基地。

要求

移栽前,平田整理

平田:头年秋收后进行旱平田。没能进行秋平田的要及时进行早春旱平地。

翻耕:稻田整平后进行一次深翻耕,耕深20厘米以上,要犁深耕透,防止漏耕;之后再浅耕1次—2次,筑好田埂。

泡田整地:移栽前放水泡田2天—3天(盐碱较重的田要大水泡5天—7天)后浅水泡田,使田面高低不超过3厘米。

插前施肥

1.施肥原则。坚持使用农家肥,禁止使用化肥。亩施腐熟农家肥2000公斤—3000公斤。2。结合第一次深翻耕,亩施农家肥2000公斤—3000公斤,翻压入土,要耕深压严;基施有机农家肥应结合稻田最后一次浅耕,全部施入土壤。

移栽

移栽期:一般要求5月20日前结束插秧。

移栽密度:行距为27厘米■13厘米,每穴4株—5株。对供水保障率偏低以及秧苗素质较差和土壤瘠薄的地方应适当增加栽插密度。

移栽要求:坚持拉线插秧,秧苗直立,行穴整齐,插后灌寸水。插秧时田间保持“花皮水”,以利浅插,插深2厘米。

追肥

分蘖肥:一般插后7天—10天,亩追施有机农家肥5公斤—10公斤,除个别苗乏处在6月下旬追施少量匀苗肥外,一般在6月5日—7月5日禁止追肥。早熟品种或晚插田,要减少施用量或不施肥。

穗肥:一般在7月5日—7月15日,每亩施入有机农家肥5公斤,早熟品种或生长量不够的,可提前3天—5天追肥。

灌水

秧苗移栽大田后,田面保持薄水层返青活苗,决不能晒苗,同时要注意低温,适当增加灌水深度。在返青后的各生育阶段,灌水后田面不在保持水层(除施药追肥外),以土壤表象达到灌水指标时再灌水(各生育阶段灌水前土壤表象指标详见附表),每次灌水后自然落干。

除草

水稻移栽后,进入分蘖期进行人工除草(也可放草鸭采食、践踏防除)。在移栽后15天—30天进行除草,后期人工拔除杂草。

病虫害防治

优先采用农业措施,通过选用抗病抗虫品种进行非化学药剂种子处理培育壮苗;加强栽培管理,采取中耕除草、秋季深翻晒土、清洁田园等措施,可以起到防治病虫害草害的作用;尽量利用灯光、色彩诱杀害虫,用机械捕捉害虫;用机械和人工等方式除草;严禁使用化学制剂(农药、生长调节剂等)、高毒生物农药等防治病虫害草害。

常发病、虫草害种类 1.水稻稻瘟病。分为叶瘟、穗瘟、节瘟等。采用水稻旱育稀植的方法,水稻插秧密度大幅度降低,改变了稻瘟病发生的田间小气候,一般在伊犁地区发生不重,相对病残体

较少,不需要防治。但如果上年度降水偏多,有利于越冬病稻草上的菌丝产生分生孢子,孢子的萌发会使叶瘟发生。2.稻飞虱。往年也有发生,但危害不大。如果冬春季气温偏高,可能产生危害。3.草害。稗草、鸭舌草、莎草等杂草会对稻田产生危害。

防治措施(农业防治措施) 1.病害。选用抗抗稻瘟病品种;适时播种,改进播种方法,以达到避病的目的;建立无病留种田,可以减少初侵染源;烧毁病稻草,可减轻稻瘟病的发生。2.虫害。冬季深耕翻土,深水泡田能使在土壤中越冬的螟虫大部分死亡,降低来年基数。3.草害。田平沟通,催芽播种,早施断奶肥和分蘖肥促使早分蘖、早封行,以苗压草;早建水层,以水控草;后期(杂草籽粒成熟落粒前)及时拔除田间杂草,减少翌年发生量;结合耕地整地,诱发杂草,并实施“养草灭草”;水旱轮作,减少杂草。

物理防治措施 1.害虫防治。人工捕捉,收获卵块,拔除枯心团,诱集或诱杀(频振式杀虫灯等)。2.病害防治。筛选种子,去除病粒,用温水或泥水浸种去除病粒;采取晒种的方法减少病菌侵入。3.草害防治。精选稻种,清除杂草种子。

药剂防治原则 1.药剂(必须是低毒生物农药或有机标准允许使用的农药)防治对不同的地块要保证同一方向、同一进度。2.每次药剂防治必须由基地指派技术指导员现场进行指导药剂配置和喷施操作。3.允许使用病虫害药剂(见下表)。

植物保护允许使用物质表

植物制剂(大蒜素水、苦参及其制剂、天然除虫菊及其制剂等)

石灰

细菌制剂(苏云金杆菌BT乳剂等)

真菌制剂(白僵菌、轮枝菌、菌克毒克)

机械诱捕器(杀虫灯)

记录要求 每次药剂防治结束后,原料基地负责人要填写“农事记录”中“药剂防治”栏并签字,有机食品管理小组或有机食品检验员对药剂防治效果及是否用违禁药剂进行审核并签字。

收获 适时收获期为完熟前期,从齐穗到收割一般为45天左右,全穗失去绿色,上部有1片—2片叶保持绿色,颖壳95%基本变黄,米粒转白,手压不变型。稻谷含水量在19%—22%收割为宜。做到成熟一块收割一块。

脱粒 采用联合收割机收获,以减少稻谷损伤。缓冲带区域的水稻(属于非有机原料)要单独收获、单独脱粒,不得混入有机稻谷中。

有机稻谷运输 须由专用工具运送,运输工具应清洁、干燥,有防雨设施及机食品专用标识。严禁与有毒、有害和有腐蚀性、有异味的物品混运。

有机稻谷储藏 在避光、常温、干燥和有防潮设施的地方妥善保管储藏。储藏设施应清洁、干燥、通风,无虫害和鼠害,有明显的有机食品标识;严禁与有毒、有害、有腐蚀性、易发霉、发潮、有异味的物品混放;严禁使用化学物质防虫、防变,杜绝二次污染。

副产品处理 有机食品水稻生产的副产品包括秸秆等,应综合开发,合理利用,提倡秸秆还田,严禁焚烧、乱堆放、丢弃和污染环境。

各生育阶段灌水前土壤表象指标表

时间	生育期	灌水前土壤表象
5月中旬—5月下旬	返青期	保持1厘米—3厘米水层。如遇低温,略加大水层
	分蘖前期	田面无水面稍有沉实、陷脚、粘脚
	分蘖中期	田面沉实、稍陷脚,局部有细小裂缝
5月下旬—7月上旬	分蘖后期	田面不陷脚,有1厘米左右裂缝
	拔节孕穗期	田面沉实、不陷脚,无裂缝,脚踏有浅脚印
	抽穗开花期	田面沉实、无裂缝,不粘脚,脚踏有浅脚印
7月初—8月上旬	乳熟期	田面沉实、无裂缝,不粘脚,无脚印
8月上旬—8月中旬	黄熟期	9月中旬(9月12日左右)断水